

全国の情報は国立感染症研究所感染症疫学センターホームページにてご覧ください。 <http://www.nih.go.jp/niid/ia/from-idsc.html>

新型コロナウイルス感染症に関する情報


兵庫県内の新型コロナウイルス新規感染者数は今週 **10,060** 人(先週 **10,951** 人)で、対先週比 0.92 倍となり、ほぼ横ばいの状態で推移しています。年齢階級別割合においては、10歳未満、10歳代が最も多く、同率で全体の19%、次に30歳代が16%、20歳代が15%となっています。

兵庫県は第7波の到来を防ぐために、5月をワクチン接種促進月間と位置づけ、県内市町と連携して県民のワクチン接種を促進しています。現在流行しているオミクロン株(BA.2)はワクチン3回接種の有効性が高く、重症化予防にもなると報告されています。兵庫県の30歳代以下のワクチン接種率はまだ3割台です。ワクチンの積極的な接種をご検討ください。また、今後も引き続き感染の拡大を防ぐためにもマスクの着用、手洗い、換気、3密の回避など、基本となる感染防止対策の徹底をお願いします。


新型コロナウイルスに関する厚生労働省、国立感染症研究所、兵庫県の情報が兵庫県立健康科学研究所感染症部のホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html)からご覧になれます。

*4月1日からHPが新しくなりました。旧HPは閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

新型コロナウイルス 新規感染者数の推移(週別)



新型コロナウイルス新規感染者の 年齢階級別割合(20週)



定点把握感染症(指定された医療機関から報告を求める感染症です)

定点あたり患者数の上位10位の疾病

順位	疾病名	定点あたり患者数		増減	順位	疾病名	定点あたり患者数		増減
		今週	先週				今週	先週	
1位	感染性胃腸炎	5.67	4.28	+1.39	6位	RSウイルス感染症	0.08	0.07	+0.01
2位	突発性発しん	0.30	0.35	-0.05	7位	水痘	0.07	0.05	+0.02
3位	A群溶血性レンカ球菌咽頭炎	0.20	0.45	-0.25		無菌性髄膜炎	0.07	0.00	+0.07
4位	流行性角結膜炎	0.14	0.11	+0.03	9位	手足口病	0.05	0.05	±0.00
5位	咽頭結膜熱	0.12	0.15	-0.03		ヘルパンギーナ	0.05	0.00	+0.05

全数把握感染症（すべての医療機関から報告を求める感染症です）

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 9人 （保健所：姫路市1人、西宮市1人、明石市2人、伊丹管内1人、宝塚管内1人、加古川管内2人、丹波管内1人）
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 2人 （①姫路市；有症者；女性2歳；O157VT1；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、②西宮市；無症状病原体保有者；女性20歳代；O146VT型不明；感染地域：不明；感染経路：接触感染）（累積報告数16人；有症者9人、HUS0人）
4 類感染症	つつが虫病 1人 （姫路市；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） デング熱 1人 （神戸市；デング熱；男性40歳代；感染地域：フィリピン；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染） 日本紅斑熱 3人 （①姫路市；女性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染、②姫路市；男性70歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染、③加東保健所管内；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：その他） レジオネラ症 2人 （①神戸市；肺炎型；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：塵埃感染、②神戸市；肺炎型；男性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：水系感染）
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌感染症 1人 （神戸市；男性80歳代； <i>Serratia marcescens</i> ；感染地域：不明；感染経路：不明） 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1人 （神戸市；女性60歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：無） 侵襲性肺炎球菌感染症 2人 （①姫路市；女性80歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：無、②西宮市；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明；ワクチン接種歴：不明） 梅毒 7人 （①神戸市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性50歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、②神戸市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、③姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性60歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、④姫路市；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑤西宮市；早期顕症梅毒Ⅱ期；女性20歳代；感染地域：不明；感染経路：異性間性的接触、⑥宝塚保健所管内；早期顕症梅毒Ⅰ期；男性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触、⑦加東保健所管内；無症状病原体保有者；女性40歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：異性間性的接触） 百日咳 1人 （西宮市；女性10歳代；感染地域：国内；感染経路：不明；ワクチン接種歴：4回有）
2022年第19週までに診断されたものの報告遅れ	カルバペネム耐性腸内細菌感染症 2人 梅毒 2人



ダニ媒介感染症（日本紅斑熱・つつが虫病）

今週、日本紅斑熱の報告が3人、つつが虫病の報告が1人ありました。これらは主に病原体（リケッチア）を保有するダニに咬まれることで感染します。

日本紅斑熱は *Rickettsia japonica* を保有するマダニ（キチマダニ、フタトケチマダニ）の刺咬により感染し、潜伏期間は2～8日で、発熱、発疹、刺し口が赤く腫れ中心部がかさぶたになるのが特徴です。


つつが虫病は病原体である *Orientia tsutsugamushi* を保有するツツガムシ（ダニ類）の刺咬により感染し、潜伏期間は5～14日で、日本紅斑熱と同じく発熱、発疹、刺し口の腫れ、かさぶたが見られます。

ダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った2週間内に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。




目で見える動向（県内）

水痘



朝来保健所管内で、定点あたり患者数が注意報レベル開始基準値である1.0以上となっています。

感染性胃腸炎



定点あたりの患者数は5.67人（先週4.28人）で増加しています。施設・学校における感染症集団発生状況では、今週1件（先週1件）の集団発生が報告されています。

検査情報（兵庫県立健康科学研究所）

日本紅斑熱患者3人（女性70歳代、血液5/10採取、男性70歳代、血液5/11採取、男性40歳代、血液5/17及び痂皮5/16採取）から日本紅斑熱リケッチアの遺伝子を検出しました。

つつが虫病患者1人（男性70歳代、血液及び痂皮5/9採取）から、つつが虫病リケッチアの遺伝子を検出しました。

この週報はホームページ（https://web.pref.hyogo.lg.jp/iph01/kansensho_jyoho/infectdis.html）にも掲載しています。

また、<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html> から国立感染症研究所感染症疫学センターの週報（IDWR）がダウンロードできます。