

## 中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領（暫定版）

国立感染症研究所

平成 27 年 6 月 10 日改訂

2012 年 9 月以降、中東地域に居住または渡航歴のある者を中心に中東呼吸器症候群(MERS)の患者が断続的に報告されており、医療施設や家族内等において限定的なヒトヒト感染が確認されていることから、接触者調査を実施し、適切な対策を実施することで感染拡大を防止することが重要である。また、高齢者や基礎疾患のある者に感染した場合、重症化する恐れもあることから、患者に対する適切な医療の提供も重要である。なお、中東においては一部の患者の感染原因としてラクダへの曝露が示唆されている。また、韓国において、中東への渡航歴のある MERS の確定例を発端とし、その接触者において死亡例を含む多数の患者が発生していることを踏まえ、平成 27 年 6 月 4 日に「情報提供を求める患者の要件」が変更されたところである。

本稿は、国内で探知された中東呼吸器症候群(MERS)の疑似症患者及び患者(確定例)(以下「症例」という。)等に対し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15 条による積極的疫学調査を迅速に実施するため、平成 26 年 7 月 30 日版に暫定版として作成した中東呼吸器症候群(MERS)に対する積極的疫学調査実施要領を韓国事例の発生をうけて更新したものである。なお、疫学状況の変化に伴い適宜見直しを行うこととする。

調査票ダウンロード (Excel file)国立感染症研究所ホームページ<http://www.nih.go.jp/nid/a/diseases/alphabet/mers.html>

## (調査対象)

○積極的疫学調査の対象となるのは、以下に定義する「疑似症患者」、「患者(確定例)」、「濃厚接触者」および「その他の接觸者」である。

- ・積極的疫学調査の対象となる「疑似症患者」とは、平成 27 年 6 月 4 日付健感第 0604 第 1 号に示す「情報提供を求める患者の要件」に合致しかつ地方衛生研究所で実施された PCR 検査により MERS コロナウイルス遺伝子陽性であったものを指す。
- ・「患者(確定例)」とは、地方衛生研究所以外に国立感染症研究所において実施される追加検査によって MERS コロナウイルス遺伝子陽性であったものを指す。
- ・「濃厚接觸者」とは、症例が発病した日以降に接觸した者のうち、次の範囲に該当するものである。

- i. 世帯内接觸者：症例と同一住所に居住する者
- ii. 医療関係者等：個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感染予防策なしで、症例の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者

- iii. 汚染物質の接触者： 症例由来の体液、分泌物（痰など（汗を除く））などに、必要な感染予防策なしで接触した者等。
- iv. その他： 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として2メートル）で、必要な感染予防策なしで、症例と接触があつた者等。
  - ・「その他の接触者」とは症例が発病した日以降に症例と同じ病棟に滞在する等空間を共有する接觸があつたもののうち、濃厚接觸者の定義に該当しないものや、必要な感染予防策をした上で確定例や確定例由来の検体と接觸した医療関係者や搬送担当者等を含む。確定例が発病後、公共交通機関等、不特定多数の者が利用する施設の利用があつた場合は、その症状や、状況等を検討した上でメディア等を使った接觸者探知を行う必要があるかどうかを検討する。

#### （調査内容）

- 積極的疫学調査の対象となる「疑似症患者」および患者（確定例）について、基本情報・臨床情報・推定感染源・接觸者等必要な情報を収集する。（添付1,2-1,2-2,2-3）
  - 濃厚接觸者については、最終曝露から14日間、一日2回健康観察を実施するとともに、MERSのハイリスク者（例：高齢者、基礎疾患のあるもの）との接觸を避けるよう要請する。また、健康観察を十分に行うために長距離の移動等は控えるよう要請する。（添付3）
  - その他の接觸者については、以下に示すような症状が出てきた場合に、保健所に連絡をするようにする。
  - 濃厚接觸者およびその他の接觸者については、健康観察中に37.5°C以上の発熱、または急性呼吸器症状（上気道または下気道症状）がある者（検査対象者と呼称する）については、検査を実施し、その結果に応じて必要な調査と対応を行う。
- （調査時の感染予防策）
- 積極的疫学調査の対応人員が症例及び検査対象者に対面調査を行う際は、手袋、サージカルマスクの着用と適切な手洗いを行うことが必要と考えられるが、現時点では、疫学的な知見に乏しい新規の呼吸器感染症への対応として、ゴーグル、ガウンを追加し、必要に応じてサージカルマスクではなくN95マスクを着用する。（PPE（感染防護服）着脱に関するトレーニングを定期的もしくは事前に積んでおくことが重要である。）  
(濃厚接觸者およびその他接觸者への対応)
  - 濃厚接觸者やその他接觸者の家族や周囲の者（同僚等）に対しては、特段の対応は不要である。
  - 濃厚接觸者およびその他接觸者については、手洗いと咳エチケットを徹底するように指導する。
  - 検査対象者については、検査結果が判明するまでの間、感染伝播に十分に配慮する必要があり、本人の同意を得た上で、医療施設における個室対応などの対応も選択肢となりうる。

る。

(とりまとめ)

○濃厚接触者の健康情報については、複数の保健所が関与する場合、初発症例の届出受理保健所又は濃厚接触者の多くが居住する地域を所管する保健所が適宜とりまとめる。